



Sinais e Sintomas de ITU's não complicadas^{5, 6}



Fatores de risco^{1, 7}



Mulher

Relações Sexuais

Catéter

Diafragma

Genética

Idade avançada

15
cápsulas



CNP 6502039

30
cápsulas



CNP 6502112

Posologia e recomendações de utilização¹⁰

Em caso de **cistite aguda**

- A partir do desenvolvimento dos primeiros sintomas de desconforto urinário.
- 2 cápsulas por dia (1 cápsula a cada 12 horas) durante cinco dias.

Em caso de **infecções recorrentes**

- Para prevenir a recorrência.
- 1 cápsula por dia durante pelo menos 15 dias consecutivos.
- O tratamento pode ser repetido em ciclos de 3 meses.

Infeções do trato urinário inferior



50% das mulheres são afetadas pelo menos uma vez na vida por uma infecção urinária.¹

O uropatógeno mais comum em mulheres de **18-65 anos** é *Escherichia coli*.²

O início da atividade sexual aumenta o risco de sofrer uma ITU em **3,5 vezes**²

O risco de ITU é 3-5 vezes maior com o uso de um diafragma.³

20-30% das mulheres que sofreram infecção urinária uma vez, sofrem recorrências mais tarde.⁴

Distribuído por:



Sangool Produtos para a Saúde e Higiene, Lda
Rua Casal dos Mortais, nº 8, R/C Esq. 2625-692 Vialonga
Tel.: +351 219527660 Fax: +351 219526447
email: geral@sangool.pt www.sangool.pt




NOVENTURE, S.L.
Avenida Diagonal, 549, 5ª planta
08029 Barcelona - España



Utipro[®] Plus AF inovação para o **controle** e **prevenção** das infecções urinárias¹⁰

Componentes de origem natural



Utipro Plus AF é um produto livre de componentes de origem animal

Mecanismo de ação inovador

INTESTINO

O **xiloglucano-gelose** cria uma película que reveste a superfície da mucosa intestinal, **impedindo a adesão e crescimento das bactérias** assim como evitando a sua ascensão para a bexiga.



BEXIGA

O hibisco e o propólis acidificam a urina, eliminando a *E. coli*, favorecendo o controle dos sintomas locais:


- Ardor e dificuldade de urinar.
- Aumento da frequência das micções.
- Sensibilidade ou dor na bexiga.
- Urgência para urinar.



Utipro[®] Plus AF

- **Controle** dos primeiros sintomas e progressão das infecções agudas¹⁰
- **Prevenção** das recorrências causadas por *E. coli* e outras bactérias uropatogénicas¹⁰

Utipro Plus AF é seguro, bem tolerado e reduz os parâmetros bacteriológicos e sintomáticos em adultos, com ITUs não complicadas.⁸



*Urocultura, também chamada de cultura de urina, serve, não só para confirmar o diagnóstico de infecção urinária, como para detetar qual a bactéria envolvida. No dia 6, apenas um paciente tratado com Utipro Plus AF registava urocultura positiva.

Uma vantagem para a **prevenção** de recorrências causadas por *E. coli* e outros uropatogénicos

Utipro Plus AF **melhora** a qualidade de vida das mulheres com ITUs, **reduzindo as recorrências e a utilização de antibióticos**⁹.

Após 6 meses, o grupo tratado com Utipro Plus AF mostrou resultados notáveis, uma vez que **84% dos pacientes** relataram uma **melhoria clínica significativa da sua qualidade de vida**⁹.

1. Foxmann B. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. Am J Med. 2002; 113(1A): 5-13. 2. Cistitis recurrentes en la mujer. Actualidad terapéutica. 7DM n.º 856. Mayo 2014. 3. University of Michigan Health System. Urinary Tract Infection Guideline for Clinical Care 1999. 4. Grabe M, Bartoletti R, Björklund TE, Cai T, Cek M, Köves B et al. Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology 2009. Update March 2009. 5. Brenes F., Naval E., Gomez J., Cañada JL, Rodenas JL, Mendez-Cabeza JC. Manual de evaluación diagnóstica y terapéutica de las infecciones del tracto urinario. Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista 6. Síntomas Genitourinarios. Guías médicas SECPAL, consultado 10 mar 2017. Disponible en: <http://www.secpal.com/SINTOMAS-GENITOURINARIOS> 7. Andreu A. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2005;23 (Supl.4):15-21 8. www.nlm.nih.gov. USA: MedlinePlus. [26/09/2015; consultado 8 mar 2016]. Disponible en: <https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000391.htm> 9. Costache RC, Novac B, Bardan TR, Agapie DN, Edu A. Xyloglucan+Gelose Combination versus Placebo as Adjuvant Therapy to First-Line Antimicrobials for Uncomplicated Urinary Tract Infection in Adults. Urologia Internationalis 2018 9. Cai T, Tamanini I, Cocci A, di Maida F, et al. Xyloglucan, hibiscus and propolis to reduce symptoms and antibiotics use in recurrent UTIs: a prospective study. Future Microbiology 2019 10. Instruções de utilização de Utipro Plus AF